



Prof. Roberto Capone

Funzioni reali di una variabile reale

Corso di Analisi Matematica I
2020/2021

Laurea in Ingegneria Aerospaziale/Meccanica



Verso il concetto di funzione

Il termine funzione già appare in alcuni scritti del matematico Leibniz (1646-1716). Tuttavia, in un primo momento tale termine venne usato in riferimento a espressioni analitiche che danno la dipendenza di una quantità numerica da altre. Successivamente la nozione ha subito delle generalizzazioni ottenendo, nel secolo scorso, la sua formulazione definitiva.

Definizione

Dati due insiemi S e T e una parte X di S , si chiama funzione da S verso T , definita in X o anche funzione di X in T , una corrispondenza tra elementi di S ed elementi di T la quale ad ogni elemento x di X fa corrispondere uno ed un solo elemento y di T

Verso il concetto di funzione



L'insieme X si chiama insieme di definizione o anche dominio della funzione f ; il sottoinsieme T costituito dagli elementi che sono corrispondenti per mezzo di f di elementi di X si chiama insieme dei valori o anche codominio della funzione f . Si dice anche che f è una funzione definita nella parte X di S e a valori nell'insieme T

Funzioni iniettive, suriettive, biettive

Definizione

Una funzione $f: X \subseteq S \rightarrow T$ si dice una funzione di X su tutto T o anche una funzione suriettiva, se il codominio della funzione, $f(X)$ coincide con T ; ovvero, equivalentemente, se ogni elemento y di T è corrispondente per mezzo di f di almeno un elemento x di X

Definizione

Una funzione $f: X \subseteq S \rightarrow T$ si dice iniettiva se, a due qualunque elementi x' e x'' distinti di X fa corrispondere due elementi $f(x')$ e $f(x'')$ anch'essi distinti

Funzioni iniettive

Definizione analoga è la seguente:

Una funzione $f: X \subseteq S \rightarrow T$ si dice iniettiva se ogni elemento di T ha al massimo una controimmagine in S o, ciò che è lo stesso, se manda elementi distinti in elementi distinti.

Geometricamente dire che ogni elemento di R ha al massimo una controimmagine equivale a dire che ogni retta orizzontale deve intersecare il grafico della funzione al massimo in un punto

Funzioni iniettive

Data una funzione reale di variabile reale $y = f(x)$:

- Per dimostrare che f non è iniettiva basta esibire una coppia di elementi distinti x_1, x_2 , appartenenti all'insieme di definizione della funzione tali che $f(x_1) = f(x_2)$;
- Per provare, invece che f è iniettiva, occorre mostrare che $\forall x_1, x_2 \in I.D.$ vale l'implicazione
$$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$$

Funzioni suriettive

La definizione di funzione suriettiva può essere data anche nel seguente modo:

Una funzione $f: X \subseteq S \rightarrow T$ si dice suriettiva se ogni elemento di T ha almeno una controimmagine in A e ciò vuol dire che f è suriettiva quando si verifica che

$$\forall y \in T: \exists x \in X \mid f(x) = y$$

Geometricamente

Una funzione reale di variabile reale (per cui si assume come codominio \mathbb{R}) è suriettiva se e solo se ogni retta orizzontale deve intersecare il grafico della funzione in almeno un punto.

Funzioni iniettive, suriettive, biettive


Definizione

Una funzione si dice biettiva (o biunivoca) se è sia iniettiva sia suriettiva

ESEMPIO

$$y = 2x - 1$$


- Suriettiva
- Iniettiva
- Biiettiva



ESEMPIO


$$y = -x^2 + 4$$

- Suriettiva se $y \in]-\infty; 4]$
- Non iniettiva se $x \in]-\infty; +\infty[$




Funzioni biettive

Si può anche dire che la funzione $f: X \subseteq S \rightarrow T$ è biunivoca se ogni elemento y del codominio di f è il corrispondente per mezzo di f di un solo elemento x di X ; ovvero, equivalentemente, se $\forall y \in T$ o non esiste nessun $x \in X$ tale che $y = f(x)$ o, se ne esiste uno, questo è unico. È anche ovvio che la funzione f non è biunivoca se e solo se esiste almeno una coppia (x', x'') di elementi di X tale che $x' \neq x''$ in corrispondenza dei quali si ha $f(x') = f(x'')$



$$x' \neq x'' \rightarrow f(x') \neq f(x'')$$




$$\exists (x', x''), \text{ con } x' \neq x'' \mid f(x') = f(x'')$$

La funzione inversa

Definizione

Funzione inversa


Data la funzione biettiva f definita nella parte X di S e a valori nell'insieme T . Si chiama funzione inversa di f la funzione, definita in $f(X)$ e a valori in S , che ad ogni elemento y di $f(X)$ fa corrispondere quell'elemento x di X al quale la f fa corrispondere y , cioè quell'elemento x di X tale che $y=f(x)$



Data una funzione biettiva reale di variabile reale $y = f(x)$, disegnare il grafico di f^{-1} equivale a partire dalle ordinate di f e ricavare le ascisse.

Ordinate e ascisse si scambiano i ruoli.

Il grafici di f e di f^{-1} sono simmetrici rispetto alla bisettrice del I e III quadrante.



La funzione inversa

Teorema

La funzione inversa di una funzione biunivoca è anch'essa biunivoca



Dimostrazione

Infatti, la funzione f^{-1} , inversa della f , a elementi distinti fa corrispondere elementi ancora distinti, così come la f

Immagine e immagine reciproca

Definizione

Sia f una funzione da S verso T , definita nella parte X di S . Se A è una parte di X , si chiama immagine di A per mezzo di f , e si denota col simbolo $f(A)$, il sottoinsieme di T costituito dagli elementi y corrispondenti per mezzo di f degli elementi x di A . Se B è una parte di T , si chiama antimmagine di B per mezzo di f o controimmagine o immagine reciproca, il sottoinsieme di X costituito dagli elementi x i cui corrispondenti per mezzo di f appartengono a B .



Restrizione e prolungamento di una funzione

Definizione

Se f è definita nella parte X di S e a valori nell'insieme T e X' è una parte non vuota di X , si chiama **restrizione** di f a X' la funzione definita in X' e a valori in T che ad ogni elemento x di X' assume lo stesso valore che assume f .

Definizione

Siano S e T due insiemi, X' una parte propria di S , X una parte di S tale che $X' \subset X$, g una funzione di X' in T . Una funzione f di X in T si dice **prolungamento** di g su X se la restrizione di f a X' coincide con g o, ciò che è lo stesso, se $f(x) = g(x)$
 $\forall x \in X'$

Funzioni crescenti e decrescenti


DEFINIZIONE

Funzione crescente

Una funzione $y = f(x)$ di I.D. $X \subseteq \mathbb{R}$ si dice crescente in senso stretto in un intervallo I , sottoinsieme di X ,


se, comunque scelti x_1 e x_2 appartenenti a I , con $x_1 < x_2$,

risulta $f(x_1) < f(x_2)$.



ESEMPIO

$$y = x^2 - 4$$



Crescente in

$$I = [0; +\infty[$$

Funzione non decrescente

Se, invece di $f(x_1) < f(x_2)$, vale

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$


la funzione è **crescente in senso lato** o **non decrescente**.

Funzioni crescenti e decrescenti


DEFINIZIONE

Funzione decrescente

Una funzione $y = f(x)$ di dominio $D \subseteq \mathbf{R}$ si dice decrescente in senso stretto in un intervallo I , sottoinsieme di D , se, comunque scelti x_1 e x_2 appartenenti a I , con $x_1 < x_2$, risulta $f(x_1) > f(x_2)$.



ESEMPIO



Decrescente in $]-\infty; 1]$

Non crescente in \mathbf{R}

Funzione non crescente

Se, invece di $f(x_1) > f(x_2)$, vale

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$


la funzione è **decrescente in senso lato** o **non crescente**.

Funzioni crescenti e decrescenti


DEFINIZIONE

Funzione monotona

Una funzione di dominio $D \subseteq \mathbf{R}$ si dice monotona in senso stretto in un intervallo I , sottoinsieme di D , se, in quell'intervallo è sempre crescente o sempre decrescente in senso stretto.



Funzione monotona crescente in I



Funzione monotona decrescente in I

Funzioni reali di una variabile

Una funzione f definita in un sottoinsieme X dell'insieme dei numeri reali e a valori nell'insieme dei numeri reali si chiama anche funzione reale di una variabile reale

L'aggettivo reale unito alla parola funzione sta a significare che una tale funzione è a valori nell'insieme dei numeri reali

L'aggettivo reale unito alla parola variabile sta a significare che nella scrittura $f(x)$, la x denota una variabile reale

Estremi di una funzione

Definizione

Sia f una funzione reale definita nel sottoinsieme X di \mathbb{R} . Si dice che f è dotata di minimo (risp. massimo) in X se il suo codominio $f(X)$ è dotato di minimo (risp. massimo) o, ciò che è lo stesso se

$$\exists \bar{x} \in X \text{ (risp. } \bar{x} \in X) | f(\bar{x}) \leq f(x), \forall x \in X \text{ (risp. } f(x) \leq f(\bar{x}))$$

Se ciò si verifica, il minimo (risp. massimo) di $f(x)$ si chiama il minimo (risp. massimo) della funzione f in X e si denota con uno dei seguenti simboli:

$$\min f, \min_{x \in X} f(x) \text{ (risp. } \max f, \max_{x \in X} f(x))$$

Estremi di una funzione

Definizione

Sia f una funzione reale definita nel sottoinsieme X di \mathbb{R} . Si dice che f è limitata inferiormente (risp. superiormente) in X se il suo codominio $f(X)$ è limitato inferiormente (risp. superiormente) o, ciò che è lo stesso, se esiste un numero reale k tale che si abbia

$$k \leq f(x), \forall x \in X \quad (\text{risp. } f(x) \leq k, \forall x \in X)$$

Un tale numero si chiama un minorante (risp. maggiorante) della f in X . La funzione si dice limitata in X se è ivi limitata sia inferiormente, sia superiormente.

Se f è limitata inferiormente (risp. superiormente) in X , l'estremo inferiore (risp. superiore) di f in X si denota con uno dei seguenti simboli

$$\inf f, \inf_{x \in X} f(x) \quad (\text{risp. } \sup f, \sup_{x \in X} f(x))$$

Funzioni pari e funzioni dispari

DEFINIZIONE

Funzione pari


Indichiamo con X un sottoinsieme di \mathbb{R} tale che, se $x \in X$, allora $-x \in X$. Una funzione $y = f(x)$ si dice pari in X se $f(-x) = f(x)$ per qualunque x appartenente a X .

ESEMPIO

$$f(x) = 2x^4 - 1$$

$$\begin{aligned} f(-x) &= 2(-x)^4 - 1 \\ &= 2x^4 - 1 = f(x) \end{aligned}$$

f è pari.



Funzioni pari e funzioni dispari

DEFINIZIONE

Funzione dispari

Indichiamo con X un sottoinsieme di \mathbb{R} tale che, se $x \in X$, allora $-x \in X$.


Una funzione $y = f(x)$ si dice dispari in X se $f(-x) = -f(x)$ per qualunque x appartenente a X .

ESEMPIO


$$f(x) = x^3 + x$$

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 + (-x) \\ &= -x^3 - x = -f(x) \end{aligned}$$

f è **dispari**.



Classificazione delle funzioni



La funzione lineare


Si tratta di una funzione reale del tipo

$$f(x) = ax + b, \quad \forall x \in X$$

dove a e b sono due numeri reali.

Se $a = 0$ la funzione si riduce alla funzione costante $f(x) = b$


Se $a = 1, b = 0$ essa si riduce alla funzione identica



La funzione valore assoluto

La funzione reale f così definita
$$f(x) = |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

si dice funzione valore assoluto.




$$y = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

a. La funzione valore assoluto.

Le funzioni signum e parte intera

Per ogni numero reale x , si definisce funzione $\text{sign}(x)$ la funzione sotto riportata



$$y = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$


b. La funzione segno.

Per ogni numero reale x denotiamo con $[x]$ la parte intera di x , cioè il più grande degli interi non negativi $z \leq x$, se $x \geq 0$ e il più piccolo degli interi non positivi $z \geq x$, se $x < 0$.

La funzione reale così definita:

$$f(x) = [x], \forall x \in \mathbb{R}$$

Si chiama funzione parte intera



$$y = \begin{cases} n & \text{se } n \leq x < n + 1 \\ -(n + 1) & \text{se } -(n + 1) \leq x < -n \end{cases}$$

c. La funzione parte intera.


La funzione potenza (con esponente un intero positivo)

Se n è un intero positivo, si chiama funzione potenza di esponente n , la funzione reale così definita


$$f(x) = x^n, \forall x \in \mathbb{R}$$

Se n è pari essa è una funzione di \mathbb{R} su $[0; +\infty]$ le cui restrizioni agli intervalli $]-\infty; 0]$ e $[0; +\infty[$ sono rispettivamente strettamente decrescente e strettamente crescente.

Se n è dispari, si tratta di una funzione strettamente crescente di \mathbb{R} su \mathbb{R}



$$f(x) = x^n \quad n = 2, 4$$



$$f(x) = x^n \quad n = 3, 5$$


La funzione potenza (con esponente un intero negativo)

Se n è un intero positivo, si chiama funzione potenza con esponente intero negativo $-n$, la funzione reale così definita


$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Se n è pari si tratta di una funzione di $\mathbb{R} - \{0\}$ su $]0; +\infty[$ le cui restrizioni agli intervalli $] -\infty; 0]$ e $[0; +\infty[$ sono rispettivamente strettamente crescente e strettamente decrescente.

Se n è dispari si tratta di una funzione di $\mathbb{R} - \{0\}$ su $\mathbb{R} - \{0\}$ le cui restrizioni agli intervalli $] -\infty; 0]$ e $[0; +\infty[$ sono strettamente decrescenti.



$$f(x) = 1/x^2$$



$$f(x) = 1/x^3$$


La funzione radice n-esima

Se n è pari, la restrizione di x^n all'intervallo $[0; +\infty[$ è strettamente crescente, quindi è invertibile. La sua inversa è la funzione $f(x) = \sqrt[n]{x}$ tale che


$$x \in [0; +\infty[\mapsto \sqrt[n]{x}$$

Se n è dispari, si ha una funzione strettamente crescente, quindi è invertibile. La sua inversa è la funzione $f(x) = \sqrt[n]{x}$ tale che

$$x \in \mathbb{R} \mapsto \sqrt[n]{x}$$



$\sqrt[n]{x}$, n pari




$\sqrt[n]{x}$, n dispari

La funzione potenza (con esponente un numero reale)

Se α è un numero reale non nullo, si chiama funzione potenza con esponente α la funzione reale

$$f(x) = x^\alpha$$

definita nell'intervallo $]0; +\infty[$ se $\alpha > 0$, nell'intervallo $]0; +\infty[$ se $\alpha < 0$.





La funzione esponenziale


Se a è un numero reale positivo e diverso da 1, si chiama funzione esponenziale di base a , la funzione reale f così definita:

$$f(x) = a^x, \forall x \in \mathbb{R}$$

La funzione esponenziale di base a è una funzione di \mathbb{R} sull'intervallo $]0; +\infty[$, strettamente crescente se $a > 1$, strettamente decrescente se $0 < a < 1$



La funzione esponenziale




La funzione logaritmo


Se a è un numero reale positivo e diverso da 1, si chiama funzione logaritmo di base a , la funzione reale f così definita

$$f(x) = \log_a x, \forall x \in]0; +\infty[$$

Si tratta di una funzione che ha come insieme di definizione $]0; +\infty[$ e come codominio \mathbb{R} , strettamente crescente se $a > 1$, strettamente decrescente se $0 < a < 1$




$a > 1$



$0 < a < 1$

La funzione logaritmo



Le funzioni esponenziale e logaritmo

La funzione esponenziale e la funzione logaritmica

